ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ КОЛЛОИДНЫХ ФИТОФОРМУЛ НА КРОВОТОК ГОЛОВНОГО МОЗГА И НИЖНИХ КОНЕЧНОСТЕЙ

Авторы: Мищенко Н. Г., врач-кардиолог высшей категории, врач-диетолог, доктор натуральной медицины, профессор Российской академии естествознания.

Где и когда выполнена работа: Исследовательские центры «АРГО» в Дзержинске, Пензе, Твери и Тамбове. Отчёт подготовлен в Нижнем Новгороде в 2024 году.

Опубликовано: Отчёт о проведении исследования от 31.07.2024.

Нарушения кровотока могут проявляться головной болью, головокружением, шумом в голове, тяжестью и отёками ног. Для оценки нужны не только жалобы, но и методы, показывающие кровенаполнение сосудов, их тонус, сопротивление и венозный отток.

Целью работы была оценка эффективности и безопасности комбинации «Реотон Комплекс», «Брейн Бустер» и «АнтиОксидант Комплекс» в отношении сосудов головного мозга и нижних конечностей.

Проведено открытое проспективное исследование без контрольной группы с участием 50 взрослых; наблюдение продолжалось в среднем 91,3 дня. Участники принимали утром «Реотон Комплекс» и «Брейн Бустер» по 5 мл, вечером — эти продукты и «АнтиОксидант Комплекс» по 5 мл. Оценивали давление, пульс, липидный профиль, реоэнцефалографию — исследование кровотока в сосудах головы, реовазографию сосудов ног, жалобы и переносимость. Кровенаполнение сосудов головного мозга улучшилось на 63,6% в каротидном бассейне и на 66,5% в вертебробазилярном бассейне. У пациентов с исходными отклонениями показатели вернулись к норме в 72,2% и 64,1% случаев соответственно. Тонус магистральных артерий улучшился на 55,5–61,2%, периферическое сосудистое сопротивление — на 58,4%, венозный отток — на 67,9%. В сосудах ног наиболее выраженная динамика отмечена по периферическому сопротивлению — 57,3%; кровенаполнение улучшилось на 42,7%, венозный отток — на 44,1%. Выраженность головной боли, головокружения, шума в голове и «мушек» перед глазами уменьшилась на 45–53%. Изменения давления, пульса и липидного обмена не превышали 5% и в отчёте не признаны клинически значимыми.

Таким образом, трёхмесячный курс сопровождался улучшением инструментальных показателей мозгового и периферического кровотока (кровенаполнение сосудов головного мозга в каротидном и вертебробазилярном

бассейнах, тонус магистральных артерий, периферическое сосудистое сопротивление и венозный отток); в сосудах ног наиболее выраженная динамика отмечена по периферическому сопротивлению, кровенаполнению и венозному оттоку, а выраженность головной боли, головокружения, шума в голове и «мушек» перед глазами уменьшилась.