

Клиническое изучение эффективности крема "Донна" при лечении патологии сосудов нижних конечностей.

Зав. отделением восстановительного лечения Карева А.И.;
Зав. отделением функциональной диагностики Муравлёва Ю.Г.;
Гл. врач МСЧ №2 к.м.н. Эсаулов Д.М.

Медицинская санитарная часть №2, г. Томск,

Отделение восстановительного лечения, 2003 г.

Проведено обследование и лечение 90 больных (55 женщин и 45 мужчин), в возрасте от 37 до 68 лет.


Группа А (26 пациентов) с облитерирующими заболеваниями сосудов нижних конечностей (облитерирующий эндартериит, атеросклероз сосудов нижних конечностей с синдромом Лериша).

Группа Б (32 пациента) с диагнозом: Острый тромбоз поверхностных и глубоких вен бедра и голени.

Группа В (32 пациентов) с диагнозом: хроническая венозная недостаточность, посттромбофлебитический синдром.

Результаты проведенного исследования

Результат лечения	Число больных, абс.	Число больных, %
Значительное улучшение	27	30%
Улучшение	57	63%
Без перемен	6	3%
Общая терапевтическая эффективность в %	84	93,3%



Выводы:

Крема "Донна" обладает высокой терапевтической активностью при лечении больных с сосудистой патологией нижних конечностей.

Крем "Донна", особенно в сочетании с физиотерапевтическим методом воздействия, обладает продолжительным противовоспалительным эффектом, обезболивающим и противоотечным действием, улучшает гемодинамику и реологические свойства крови.

Воздействие крема хорошо переносится больными. По эффективности он не уступает фармакологическим средствам, но в отличие от последних не обладает токсичностью, побочными и раздражающими кожу эффектами.

Применение крема "Донна" может быть рекомендовано для различных лечебных и оздоровительных учреждений.