

КЛИНИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ БАД «НЕФРОЛЕПТИН»

Руководитель: В.А. Шкурупий, чл.-корр. РАМН, директор ГУ НЦ клинической и экспериментальной медицины СО РАМН

Ответственный исполнитель: Л. М. Музыченко


Клиническое исследование БАД «Нефролептин» проводилось в феврале 2003 года на базе Научного центра клинической и экспериментальной медицины СО РАМН у больных хроническим пиелонефритом, циститом.

Дизайн исследования предполагал исследовать влияние БАД «Нефролептин», применяемой на фоне общепринятой терапии, на динамику клинических симптомов, содержание электролитов в сыворотке крови (калий и натрий), суточный диурез у больных хроническим пиелонефритом и хроническим циститом.

На момент начала исследования исследуемая группа (получавшая Нефролептин) и группа сравнения (только общепринятая терапия) имели сходные клинические проявления. При поступлении в стационар пациенты предъявляли жалобы на боли, рези при мочеиспускании, боли в поясничной области, полиурию. Суточный диурез у всех больных в обеих группах был положительным +150 - + 300 мл.

При определении содержания калия и натрия в сыворотке крови установлено, что средние значения этих электролитов не отличались от нормальных величин и составили: калий в исследуемой группе $4,5 \pm 0,51$ ммоль/л, натрий – $140 \pm 2,21$ ммоль/л, а в контроле – $4,3 \pm 0,72$ ммоль/л и $138 \pm 3,33$ ммоль/л соответственно.

Через 4 недели были проведены контрольные исследования вышеуказанных клинических и лабораторных параметров. Все пациенты отмечали улучшение общего самочувствия, тем не менее, группа, получавшая Нефролептин, продемонстрировала лучшую динамику клинической картины – см. рисунок ниже.



На основании проведенного исследования были сделаны следующие выводы

1. Применение в комплексной терапии больных хроническим пиелонефритом и хроническим циститом БАД «Нефролептин» оказывает положительное влияние на общее самочувствие и на динамику клинических проявлений.
2. Применение БАД не вызывает развития электролитного дисбаланса в сыворотке крови у больных хроническим пиелонефритом и хроническим циститом.
3. На фоне применения БАД «Нефролептин» суточный диурез остается адекватным.

Проведенные клинические исследования позволяют рекомендовать прием БАД «Нефролептин» в комплексной терапии больных хроническим пиелонефритом и циститом.